



PROCESSO SELETIVO PARA MÉDICO RESIDENTE  
nº 01/2012/HU



ESPECIALIDADES: Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Plástica e Cirurgia Vascular

**I N S T R U Ç Õ E S**

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova é de **3 (três) horas**, incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.
2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, número de inscrição e a especialidade para a qual se inscreveu. Assine-o. Transcreva os dados nos quadros abaixo e assine no local indicado. Verifique no cartão-resposta se há marcações indevidas nos campos destinados às respostas. Se houver, reclame imediatamente ao fiscal.
3. Depois de autorizado pelo fiscal, verifique se faltam folhas no caderno de prova, se a sequência de questões, no total de **40 (quarenta)**, está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. Cada questão objetiva é apresentada com **5 (cinco)** alternativas diferentes de respostas (de “A” a “E”), das quais apenas **1 (uma)** é **correta**.
5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. **Não destaque folhas do caderno de prova.**
6. Transcreva com **caneta esferográfica transparente**, de tinta **preta (preferencialmente)** ou **azul**, as respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. **Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou qualquer dano causado pelo(a) candidato(a).**
7. Durante a realização da prova não será permitida comunicação entre candidatos ou pessoas estranhas ao Processo Seletivo, bem como consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, nem uso de relógio de qualquer espécie, telefones celulares ou qualquer outro equipamento eletrônico, uso de bonés, chapéus ou qualquer outra cobertura. É vedada também a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em embalagem plástica transparente, sem rótulo e/ou etiquetas.
8. Os telefones celulares e demais equipamentos devem ser entregues desligados aos fiscais da sala, antes do início da prova. Serão acondicionados em embalagens plásticas e deverão ser solicitados ao fiscal, pelo candidato, ao sair da sala onde realizou a prova.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o cartão-resposta. Você só poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo após **1 (uma)** hora do início da prova.
10. Os **3 (três)** últimos candidatos que restarem em cada sala de prova somente poderão entregar as suas provas e o cartão-resposta e retirar-se do local simultaneamente.
11. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última folha do caderno de prova, o qual poderá ser destacado e levado com você.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

INSCRIÇÃO

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

ESPECIALIDADE



- 01)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.  
A dosagem de proteína C reativa (PCR) é um dos critérios de gravidade na avaliação de um paciente com pancreatite aguda grave. A partir de que valor passa a indicar gravidade?
- A ( ) 100 mg/dL.
  - B ( ) 50 mg/dL.
  - C ( ) 500 mg/dL.
  - D ( ) 150 mg/dL.
  - E ( ) 250 mg/dL.
- 02)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.  
Qual é o germe mais frequentemente isolado no líquido peritoneal em uma peritonite terciária?
- A ( ) *Streptococcus*.
  - B ( ) *Enterococcus*.
  - C ( ) *E. Coli*.
  - D ( ) *Proteus sp.*
  - E ( ) *Klebsiella sp.*
- 03)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.  
O pseudomixoma peritoneal resulta da contaminação peritoneal de neoplasias císticas. Qual das seguintes neoplasias está mais relacionada ao pseudomixoma peritoneal?
- A ( ) Cistoadenoma do apêndice cecal.
  - B ( ) Cistoadenocarcinoma pancreático.
  - C ( ) Adenocarcinoma do cólon.
  - D ( ) Cistoadenocarcinoma do intestino delgado.
  - E ( ) Cistoadenocarcinoma da vesícula biliar.
- 04)** Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.  
Qual o tratamento cirúrgico preconizado na síndrome de Wilkie?
- A ( ) Gastroenteroanastomose.
  - B ( ) Duodenoduodenostomia.
  - C ( ) Duodenojejunostomia.
  - D ( ) Ressecção duodenal.
  - E ( ) Duodenostomia.
- 05)** Sobre hiperplasia nodular focal do fígado, é **CORRETO** afirmar que:
- A ( ) é tipicamente sintomática.
  - B ( ) é normalmente encontrada no centro do fígado.
  - C ( ) é melhor ressecada através de hepatectomia lobar.
  - D ( ) a sua formação parece ser devida a um distúrbio embrionário no fluxo sanguíneo hepático.
  - E ( ) representa um risco significativo de ruptura espontânea.
- 06)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.  
A melhor forma de rastreamento para a detecção precoce do hepatocarcinoma em pacientes com hepatite crônica viral é...
- A ( ) nível sérico da alfafetoproteína.
  - B ( ) tomografia computadorizada.
  - C ( ) nível sérico do antígeno carcinoembrionário.
  - D ( ) níveis de fosfatase alcalina.
  - E ( ) nível sérico de alfafetoproteína associado à ultrassonografia.

**07)** Sobre a pontuação de MELD, que é utilizada no transplante hepático, é **CORRETO** afirmar que:

- A ( ) inclui uma avaliação da severidade de ascite.
- B ( ) é um preditivo de mortalidade em três meses em pacientes em espera de transplante hepático.
- C ( ) inclui a presença de encefalopatia.
- D ( ) é um preditivo de mortalidade de um ano em pacientes submetidos ao transplante hepático.
- E ( ) não é tão útil quanto a classificação de Child-Pugh.

**08)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

O tumor maligno hepático mais frequente na criança é o...

- A ( ) hepatoblastoma.
- B ( ) hepatocarcinoma.
- C ( ) carcinoma fibrolamelar.
- D ( ) colangiocarcinoma intra-hepático.
- E ( ) carcinoma de célula gigante.

**09)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Em pacientes com hepatite fulminante, a complicação que mais frequentemente leva ao óbito é...

- A ( ) falência renal.
- B ( ) hipoglicemia.
- C ( ) hipertensão intracraniana.
- D ( ) coagulopatia.
- E ( ) pneumonia.

**10)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Em uma mulher de 30 anos de idade, em uso de anticoncepcional oral, é descoberta via ultrassonografia uma massa de 4 cm no lobo hepático direito. A tomografia computadorizada (TC) mostrou uma cicatriz estrelada central na massa, que era mais nítida na fase arterial do contraste. O manejo mais adequado da lesão é...

- A ( ) suspensão do anticoncepcional oral, repetição da TC em seis meses e, se a massa não tiver regredido, realizar sua ressecção.
- B ( ) ressecção da massa com margem de 1 cm.
- C ( ) ablação com radiofrequência.
- D ( ) hepatectomia regrada.
- E ( ) observação.

**11)** Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Uma mulher de 30 anos de idade, em uso de contraceptivo oral, com sinais e sintomas de colelitíase, apresenta, à ultrassonografia, além da colelitíase, uma massa de 4 cm entre os segmentos II e III do fígado. Foi feita uma ressonância magnética, que inicialmente mostrou uma lesão de sinal baixo e com realce nodular periférico e um hiper-sinal em T2. A melhor conduta neste caso é...

- A ( ) colecistectomia videolaparoscópica mais biópsia com agulha fina da massa hepática.
- B ( ) colecistectomia videolaparoscópica somente.
- C ( ) suspensão imediata do contraceptivo oral.
- D ( ) colecistectomia aberta com ressecção em cunha da massa hepática.
- E ( ) colecistectomia aberta com hepatectomia lateral esquerda.

12) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.  
Seios de Aschoff-Rokitansky estão associados à...

- A ( ) colecistite crônica.
- B ( ) colecistite aguda.
- C ( ) colangiohepatite oriental.
- D ( ) colangite esclerosante.
- E ( ) colecistite alitiásica.

13) Em relação aos tipos de cálculos biliares, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A ( ) Cálculos puros de colesterol são comuns.
- B ( ) Cálculos marrons estão normalmente associados à doença hemolítica.
- C ( ) Cálculos pretos estão associados à infecção bacteriana.
- D ( ) A maioria dos cálculos de colesterol são radiopacos.
- E ( ) Cálculos pigmentares são escuros devido ao bilirrubinato de cálcio.

14) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Quais as origens mais comuns de sangramento gastrointestinal em um paciente que apresenta perda sanguínea (sangue vermelho rutilante) pelo reto nas primeiras horas após Bypass gástrico em Y-Roux?

- A ( ) Gastrojejunostomia e remanescente gástrico.
- B ( ) Gastrojejunostomia e jejunojejunostomia.
- C ( ) Remanescente gástrico e jejunojejunostomia.
- D ( ) Jejunojejunostomia e diverticulose.
- E ( ) Úlcera duodenal e jejunojejunostomia.

15) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Em uma paciente com apendicite aguda durante a gestação, o fator mais fortemente associado com a mortalidade fetal é...

- A ( ) comorbidades maternas.
- B ( ) atraso na administração de antibióticos.
- C ( ) apendicectomia aberta ao invés de laparoscópica.
- D ( ) perfuração apendicular.
- E ( ) idade gestacional.

16) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual das alternativas melhor descreve o papel da colecistectomia laparoscópica precoce para o tratamento da colecistite aguda (dentro das primeiras 48 horas da admissão)?

- A ( ) Aumenta a taxa de conversão para colecistectomia aberta.
- B ( ) Está associada ao incremento global da taxa de complicações.
- C ( ) Resulta em menor taxa de permanência hospitalar.
- D ( ) Está associada ao aumento da taxa de mortalidade.
- E ( ) Não deve ser realizada porque o paciente deverá receber antibióticos durante dois a três dias para esfriar o processo inflamatório.

17) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Um homem de 65 anos de idade, em bom estado geral, apresenta queimor retroesternal persistente apesar de terapia medicamentosa antirrefluxo agressiva. A esofagoscopia revela a presença de epitélio colunar no esôfago distal de 6 cm de extensão; a biópsia revelou displasia de alto grau em múltiplos fragmentos. Qual é a melhor opção de conduta?

- A ( ) Terapia medicamentosa continuada.
- B ( ) Acompanhamento com esofagoscopia e biópsia em um ano.
- C ( ) Cirurgia antirrefluxo.
- D ( ) Acompanhamento com esofagoscopia e biópsia em três meses.
- E ( ) Esofagectomia e reconstrução do trânsito alimentar.

18) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual é a melhor alternativa para o tratamento de um tumor de Klatskin localizado?

- A ( ) Ressecção de toda a árvore biliar extra-hepática com ressecção hepática se necessário.
- B ( ) Quimioterapia.
- C ( ) Radiação seguida por quimioterapia.
- D ( ) Pancreaticoduodenectomia (Cirurgia de Whipple).
- E ( ) Ressecção do terço médio da árvore biliar com hepaticojejunostomia.

19) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

A desordem metabólica mais comum após ressecção gástrica total é a deficiência de...

- A ( ) vitamina B12.
- B ( ) cálcio.
- C ( ) ferro.
- D ( ) vitamina D.
- E ( ) ácido fólico.

20) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Mulher, 45 anos de idade, com 15 anos de evolução de pancolite por colite ulcerativa, foi submetida à colonoscopia de controle. Nenhum pólipó foi detectado, tendo sido realizadas biópsias randomizadas para avaliação que mostraram no resultado da patologia displasia de alto grau na região do sigmoide. A conduta mais apropriada a ser tomada é...

- A ( ) colectomia total com ileorretoanastomose.
- B ( ) proctocolectomia com ileostomia.
- C ( ) sigmoidectomia.
- D ( ) proctocolectomia com bolsa ileoanal.
- E ( ) nova colonoscopia em seis meses e repetir biópsias.

21) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

Em um homem de 55 anos de idade, submetido à colonoscopia de controle, foi encontrado um pólipó de 1 cm, pediculado e de aspecto benigno. Foi realizada polipectomia. Após quatro horas do procedimento, o paciente desenvolve dor abdominal importante em flanco esquerdo. Realizada TC de abdômen e pelve, que mostra ar livre intraperitoneal e borramento da gordura junto ao sigmoide. A conduta mais adequada é...

- A ( ) colostomia proximal de proteção.
- B ( ) sutura primária da perfuração.
- C ( ) colectomia tipo Hartmann.
- D ( ) sigmoidectomia com anastomose primária.
- E ( ) somente antibioticoterapia endovenosa.

22) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.  
O germe mais comumente envolvido em culturas de aneurisma micótico é...

- A ( ) estafilococo.
- B ( ) estreptococo.
- C ( ) salmonela.
- D ( ) pseudomona.
- E ( ) cândida.

23) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.  
Um carcinoma de células escamosas T3 de canal anal é melhor manejado com...

- A ( ) radioterapia somente.
- B ( ) quimioterapia somente.
- C ( ) excisão local.
- D ( ) amputação retal.
- E ( ) radioterapia e quimioterapia.

24) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.  
O sítio mais comum de tumor metacrônico de um paciente tratado com câncer de laringe é...

- A ( ) esôfago.
- B ( ) assoalho de boca.
- C ( ) língua.
- D ( ) pulmão.
- E ( ) hipofaringe.

25) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.  
O sítio mais comum de feocromocitoma extra-adrenal é...

- A ( ) reto.
- B ( ) órgão de Zuckerkandl.
- C ( ) bexiga.
- D ( ) pescoço.
- E ( ) sacro.

26) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.  
A primeira anormalidade bioquímica detectada em pacientes com síndrome de MEN tipo I é...

- A ( ) hipercalcemia.
- B ( ) hipergastrinemia.
- C ( ) hipoglicemia.
- D ( ) policitemia.
- E ( ) hiperclorémia.

27) Assinale a alternativa **CORRETA** sobre o carcinoma adrenocortical.

- A ( ) O diagnóstico geralmente é feito por biópsia com agulha guiada por TC.
- B ( ) O estadiamento é baseado na histologia tumoral.
- C ( ) A presença excessiva de hormônios é comum.
- D ( ) Devido ao potencial maligno, massas de adrenal maiores que 3 cm devem ser ressecadas.
- E ( ) Mitotano é altamente efetivo em pacientes com linfonodos positivos.

**28)** Quanto aos traumas duodenais, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) As lesões de duodeno acontecem principalmente em traumas penetrantes e em sua maioria são acompanhadas de lesões de outros órgãos.
- ( ) No trauma duodenal que tem o sinal da mola espiral, está indicada a cirurgia.
- ( ) Nas lesões do tipo III de duodeno, o tratamento mais apropriado é o reparo primário da lesão associado a uma descompressão tipo jejunostomia ou duodenostomia.
- ( ) O sinal mais importante na TC de abdômen é o ar extraluminal retroperitoneal.
- ( ) As fístulas duodenais acontecem na maioria dos traumas que acometem o duodeno.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A ( ) V – V – F – V – V
- B ( ) F – V – V – F – F
- C ( ) V – F – V – F – F
- D ( ) F – V – F – V – V
- E ( ) V – F – F – V – F

**29)** Quanto aos traumas pancreáticos e hepáticos, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) As lesões pancreáticas são raras, em sua maioria são penetrantes e têm lesão vascular associada.
- ( ) A morbidade pós-operatória está ligada à lesão do ducto pancreático.
- ( ) Nas lesões extensas da cabeça pancreática, existe uma probabilidade de fístula pancreática maior do que 40% e está indicada a duodenopancreatectomia.
- ( ) Em traumas hepáticos do tipo III, o tratamento não cirúrgico pode ser realizado.
- ( ) As lesões hepáticas em trauma fechado de grau IV têm indicação cirúrgica estabelecida.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A ( ) F – V – F – F – V
- B ( ) V – V – F – V – F
- C ( ) V – F – V – V – F
- D ( ) F – F – V – F – F
- E ( ) V – V – F – F – V

**30)** Quanto às pancreatites crônicas, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) A perda funcional que existe com a fibrose é somente da função exócrina.
- ( ) A ausência de calcificações pancreáticas no exame de Raios X ou na TC exclui o diagnóstico de pancreatite crônica.
- ( ) A realização de uma CPRE pode apresentar o característico sinal de “cadeia de lagos”.
- ( ) O tratamento cirúrgico está reservado para os casos de esteatorreia e apresenta alto índice de resolução.
- ( ) A cirurgia de Puestow, anastomose laterolateral ductojejunal com esplenectomia, está indicada para ductos pancreáticos com dilatação superior a 1 cm.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A ( ) F – V – V – V – V
- B ( ) V – F – V – F – F
- C ( ) V – F – F – V – F
- D ( ) F – F – V – F – V
- E ( ) F – V – F – F – V



31) Quanto aos tumores benignos exócrinos do pâncreas, indique se são **verdadeiras (V)** ou **falsas (F)** as afirmativas abaixo.

- ( ) O cistoadenoma seroso tem seu diagnóstico estabelecido quando na patologia o epitélio mostra-se achatado e rico em colesterol.
- ( ) O cistoadenoma seroso normalmente apresenta-se como massas grandes esféricas com líquido aquoso e centro fibroso estrelado.
- ( ) Diferentemente dos cistoadenomas serosos, os cistos mucinosos são potencialmente malignos.
- ( ) O cisto mucinoso não estromal é o mais comum e está mais frequentemente localizado na cauda.
- ( ) O tumor mucinoso papilar intraductal apresenta, na duodenoscopia, a saída de muco através do orifício papilar com aspecto de “boca de peixe”.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência **CORRETA**, de cima para baixo.

- A ( ) V – V – F – F – F
- B ( ) V – F – F – V – V
- C ( ) F – V – V – F – V
- D ( ) F – F – V – F – V
- E ( ) F – V – V – V – F

32) Assinale a alternativa **CORRETA** quanto aos tumores malignos pancreáticos.

- A ( ) A CPRE é utilizada para afastar outras causas e é sugestiva de neoplasia de cabeça de pâncreas quando apresenta o sinal do “duplo ducto”.
- B ( ) O aumento de CA 19-9 é diagnóstico definitivo de neoplasia pancreática.
- C ( ) O uso de octreotida no pós-operatório de ressecções pancreáticas evita a ocorrência de fístulas.
- D ( ) A laparoscopia deve ser utilizada no estadiamento da neoplasia pancreática.
- E ( ) Em pancreatectomias corpocaudais, quando existe a ocorrência de deiscência do ducto pancreático, o uso da somatostatina diminui o tempo de fechamento da fístula.

33) Assinale a alternativa **CORRETA** quanto aos tumores endócrinos do pâncreas.

- A ( ) O gastrinoma tem a forma agressiva mais manifestada em mulheres e está associado à síndrome MEN 1.
- B ( ) O insulinoma apresenta a tríade de Whipple com sintomas de hipoglicemia, níveis baixos de insulina e alívio com administração de glicose endovenosa.
- C ( ) Os insulinomas normalmente são múltiplos e grandes.
- D ( ) A diarreia está presente em dois terços dos gastrinomas, sendo que o uso de sonda nasogástrica deve ser evitado pois pode agravar este sintoma.
- E ( ) Os glucagonomas, em sua maioria benignos, são tumores das células beta.

34) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

A doença que apresenta tumor de ilhota de pâncreas, adenoma hipofisário e hiperparatireoidismo é conhecida pelo nome de...

- A ( ) doença de Sipple.
- B ( ) doença de Werner.
- C ( ) doença de Coon.
- D ( ) síndrome de Meigs.
- E ( ) síndrome de Garden.

35) Assinale a alternativa que completa **CORRETAMENTE** a afirmativa abaixo.

De acordo com a ABA (*American Burn Association*), em um adulto com queimaduras de segundo grau, a ressuscitação hídrica venosa está indicada quando a superfície corporal queimada é maior que...

- A ( ) 5%.
- B ( ) 10%.
- C ( ) 20%.
- D ( ) 15%.
- E ( ) 25%.

36) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Qual é a contraindicação absoluta para a intubação nasotraqueal?

- A ( ) Apneia.
- B ( ) Fratura de coluna cervical.
- C ( ) Paciente inconsciente.
- D ( ) TCE.
- E ( ) Pneumotórax.

37) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

Um paciente adulto vítima de queimadura por álcool em combustão apresenta área corporal queimada de 75%, sendo 15% de primeiro grau, 40% de segundo grau e 20% de terceiro grau. A fórmula de hidratação de Brooke Army (3 ml X peso em kg X % de área queimada) é utilizada. Qual é o valor percentual de área queimada utilizada na fórmula para reposição volêmica neste caso?

- A ( ) 60%.
- B ( ) 75%.
- C ( ) 55%.
- D ( ) 40%.
- E ( ) 50%.

38) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

No atendimento ao trauma, a ligadura de que vasos é, em tese, melhor tolerada em um paciente adulto?

- A ( ) Veia cava superior.
- B ( ) Artéria femoral comum.
- C ( ) Artéria subclávia.
- D ( ) Veia porta.
- E ( ) Veia cava inferior suprarrenal.

39) Em relação aos tumores do mediastino, assinale a alternativa **CORRETA**.

- A ( ) O timoma é uma neoplasia comum que ocorre predominantemente no mediastino anterior.
- B ( ) A radioterapia pré-operatória está indicada nos pacientes com timoma estágio II.
- C ( ) Os tumores de células germinativas cursam principalmente com síndrome da veia cava superior.
- D ( ) O timoma está presente em aproximadamente 10% dos pacientes portadores de Miastenia Gravis.
- E ( ) O timoma, os tumores de células germinativas e os tumores neurogênicos ocorrem predominantemente no mediastino anterior.

40) Assinale a alternativa que responde **CORRETAMENTE** à pergunta abaixo.

A videotoroscopia pode ser utilizada em diversas situações no paciente traumatizado de tórax. Em qual das situações abaixo ela se encontra formalmente contraindicada?

- A ( ) Hemotórax maciço.
- B ( ) Hemotórax septado.
- C ( ) Pneumotórax persistente.
- D ( ) Ferimento toracoabdominal.
- E ( ) Empiema pleural.

✂-----

**GRADE DE RESPOSTAS (Somente esta parte poderá ser destacada)**

<b>QUESTÕES</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	
<b>RESPOSTAS</b>																					
<b>QUESTÕES</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	
<b>RESPOSTAS</b>																					

